







ALIMENT MINERAL
pour RUMINANTS

INTERETS

Un apport approprié en oligo-éléments et en vitamines conditionne une bonne fécondité et un intervalle "vêlage-insémination fécondante " réduit.

COMPOSITION

Phosphate bicalcique sf minérale Phosphate mono-ammonique Chlorure de sodium - Dextrine Remoulage - Phosphate magnésien Céréales germées fermentées - Sucre
- Prêle - Ortie - Mélisse - Anis Romarin - Fenugrec - Sauge - Fenouil
- Gentiane - Basilic - Hysope
-Quinquina - Fucus - Chardon bénit Laminaire - Menthe - Thym - Réglisse
- Curcuma - Charbon végétal.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Calcium 10 %, phosphore 12 %, Sodium 3 %, Magnésium 2 %

ADDITIFS:

Acides aminés, leurs sels et produits analogues :

3c301-Méthionine (DL-méthionine, techniquement pure).....1000 mg/kg

Vitamines, provitamines et substances à effet

analogue chimiquement bien définies :

3a6/2a-vitamine A	+ 100 000 UI/Kg
E671-Vitamine D3	200 000 UI/kg
3a700-Vitamine E	1 000 mg/kg
Vitamine C (Acide L-ascorbique)	7 000 mg/kg
Vitamine B1 (Mononitrate de Thiamine)	150 mg/kg
Vitamine B2(Riboflavine)	200 mg/kg
Vitamine B6	160 mg/kg
3a315-Vitamine PP (Niacinamide)	500 mg/kg
Pantothénate de Ca	150 mg/kg
3a890-Chlorure de choline	1000 mg/kg
Composés d'Oligo-éléments :	
E1-Fer (sulfate ferroux monohydraté)	500 ma/ka

E1-Fer (sulfate ferreux monohydraté)500 mg/kg
E6-Zinc (oxyde de zinc)15 000 mg/kg
E5-Manganèse (oxyde manganeux)4 600 mg/kg
E4-Cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté)500 mg/kg
E2-lode (iodate de Calcium anhydre)1 500 mg/kg
3b8.10-Sélénium (Sélénite de sodium)20 mg/kg
E8-Sélénium (sf organique)30 mg/kg
3b805-Cobalt (Sulfate de Cobalt heptahydraté)90 mg/kg
1g-Liants: E 559-Argiles kaolinitiques exemptes
d'amiante : 16600 mg/kg.

Une teneur supérieure à 10 mg/kg de cuivre par kg de ration journalière totale peut être gravement préjudiciable pour la santé de certaines races ovines.

PRESENTATIONS

Préparation mini-granulés : Boîte de 1,5 kg Seau de 14 kg Caisse de 30 kg

CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication

24 mois à partir de la date de fabrication pour les conditionnements soius vide



La granulation à froid :

Un process de fabrication spécifique et respectueux de l'intégrité des ingrédients. La fragilité de certains ingrédients comme les vitamines, les levures, les extraits naturels de plantes, les oligo-éléments sous formes de chélates ou encore les acides aminés protégés nécessitent de développer des méthodes de production originales. La granulation à température contrôlée permet de ne pas dépasser 30°C pendant toute la durée de la production. Ainsi, les agents actifs les plus thermosensibles sont mieux préservés.

INFOS

Son objectif est de prévenir les interactions chimiques. Les vitamines sont des ingrédients particulièrement sensibles qui sont altérés en cas de contact prolongé avec des minéraux et des oligo-éléments (oxydation). La granulation séparée des vitamines et minéraux permet d'empêcher ces interactions pour garantir une meilleure conservation du produit dans le temps.

INTERET DES OLIGO-ELEMENTS

- -Le cuivre: Il intervient dans le métabolisme de l'énergie. Il joue également un rôle dans la protection d'oxydation cellulaire. Il agit dans la synthèse enzymatique et hormonale et participe notamment à la synthèse des hormones sexuelles.
- -Le manganèse: Il a une action sur les hormones thyroïdiennes et les besoins sont plus élevés pour la reproduction que pour la croissance.
- Le zinc : Il intervient dans la synthèse protéique et dans la néoglucogénèse. Le zinc est un oligo-élément trés important qui agit sur la fécondité. Il intervient pour la formation des organes sexuels.
- Le cobalt : Il est nécessaire à une bonne synthèse de la vitamine B12. La vitamine B12 est requise pour la transformation du propionate en glucose et pour le métabolisme de l'acide folique.
- Le sélénium : Il est considéré comme un élément essentiel contre le stress oxydatif. Un déficit des besoins peut entraîner des avortements ou la naissance de veaux faibles ou encore incapables de téter. La supplémentation des rations avec du sélénium permet de réduire l'incidence des rétentions placentaires, des ovaires kystiques, des mammites et des métrites.

INTERET DES VITAMINES

- La Vitamine A: Elle est nécessaire au maintien des cellules protectrices (épithéliales) du système respiratoire, du système reproductif et du système digestif. Elle joue également un rôle dans la reproduction, le développement des os et de la vision.
- La Vitamine D3: Elle participe à l'absorption du calcium et du phosphore à travers la paroi intestinale.
- La Vitamine E: la vitamine E est appelée "vitamine antioxydante". Elle travaille en relation directe avec le sélénium pour protéger les structures cellulaires.

INTERETS DE CERTAINES PLANTES SELECTIONNEES

- Tussilage : Intéressant dans le cas de bronchite emphysémateuse.
- Ortie: Intéressant dans les cas de faiblesse et de manque d'appétit, de convalescence et d'anémie. Cette plante a également un effet dépuratif et anti-inflammatoire. Elle est intéressante dans le cas de décalcification, onglons et sabots de mauvaise qualité.
- **Prêle des champs**: Intéressant dans les cas de décalcification, arthrose, rachitisme (action de la silice sur la construction de l'os et du tissu conjonctif). Action diurétique modérée dans les oedèmes et le drainage toxinique.
- Fenouil doux : Trés utile pour les météorisations et les indigestions
- Chardon bénit : Stimulation d'appétit et efficace dans le cas d'indigestion simple.
- **Eleuthérocoque**: Intéressant dans les cas de fatigue, convalescence, stress, transport... Amélioration de la récupération du cheval de sport ou de randonnée. Stimulation de la résistance contre les infections et les parasitoses.

UTILISATION

EN ENTRETIEN : REGETOTAL pourra être distribué aux animaux, associé à la ration d'une façon :

1 - Régulière (tous les jours) / 2 - Irrégulière (tous les deux jours, une fois par semaine, etc...)

BOVINS

Races à viandes :

 $10\,g$ par jour et par tête ou $70\,g$ à distribuer dans la semaine par tête.

Races à lait :

Haute production : 20 à 25 g par jour et par tête ou 140 à 180 g à distribuer dans la semaine par tête.

Moyenne production: 15 g par jour et par tête ou 100 g à distribuer dans la semaine par tête.

POUR DES BESOINS ACCRUS

Aux périodes critiques de l'élevage (fin de gestation et accouchement, mise à la reproduction, fin d'hivernage...)

REGETOTAL pourra être donné de façon intensive pendant 10 à 15 jours à la dose journalière suivante :

BOVINS:

100 g par tête

OVINS - CAPRINS - PORCINS :

30 g par tête

OVINS - CAPRINS

Races à viandes :

2 à 3 g par jour et par tête ou 20 g à distribuer dans la semaine par tête.

Races à lait :

Suivant les besoins de la production laitière 5 à 7 g par jour et par tête ou 30 à 50 g à

distribuer dans la semaine partête PORCINS

A l'engraissement :

2 à 3 g par jour et par tête ou 15 à 20 g à distribuer dans la semaine par tête.

A la reproduction (truie):

5 à 7 g par jour et par tête ou 40 à 50 g à distribuer dans la semaine par tête.

